

الحادية عشر الجاني 2022	سلسلة تمارين القوى في مجموعة الأعداد الحقيقية	المدرسة الإعدادية نهج كراتشي باردو الأستاذة : الشريف
<b>التمرين ١-١</b>		

أجب بصواب أو خطأ مع تعليق الإجابة في كل حالة

$-3\sqrt{5^3} = -15\sqrt{5}$ (2)	$\left(\frac{5}{\sqrt{3}}\right)^{-2} = \frac{3}{25}$ (1)
$\sqrt{7^2} + \sqrt{7^4} = \sqrt{7^6}$ (4)	$\left(-\frac{\pi}{3}\right)^{-11} = \left(\frac{3}{\pi}\right)^{11}$ (3)
$\sqrt{10^{-8}} = 10^{-4}$ (6)	$\frac{\sqrt{3^{45}}}{\sqrt{3^5}} = \sqrt{3^9}$ (5)

## TuniTests

### التمرين ٢-١

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية علما وأنه واحدة فقط هي صحيحة

(1) العدد  $-\frac{1}{8}$  يساوي : (أ)  $-\sqrt{2}^{-3} \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3$  (ب) 1 (ج)  $\frac{1}{8}$

(2) العدد  $7(\sqrt{7})^{-2}$  يساوي : (أ)  $\frac{1}{(7\sqrt{7})^2}$  (ب)  $\frac{1}{49}$  (ج) 1

(3) العدد  $\left(-\frac{6}{7}\right)^{-15}$  يساوي : (أ)  $\left(\frac{6}{7}\right)^{15}$  (ب)  $\left(\frac{7}{6}\right)^{15}$  (ج)  $\left(-\frac{7}{6}\right)^{15}$

(4) العدد 0,003478 يساوي : (أ) 0,003478 (ب)  $3,487 \times 10^{-3}$  (ج)  $3,487 \times 10^3$

(5) العدد  $[(\sqrt{2})^{-2}]^4 \times 125 - [(\sqrt{2})^{-2}]^4 \times 100$  يساوي : (أ)  $3,487 \times 10^{-6}$  (ب)  $3,487 \times 10^{-3}$  (ج)  $3,487 \times 10^3$

(6) العدد  $(\sqrt{3})^{-2} + (-\sqrt{3})^2$  يساوي : (أ) 25 (ب) 16 × 25 (ج)  $\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^4$

(7) العدد  $\frac{10}{3}$  يساوي : (أ) 1 (ب) 0 (ج)  $\frac{10}{3}$

### التمرين ٢-٢

أحسب

$$\left[ \frac{-5\sqrt{2}}{\frac{3}{7\sqrt{2}} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{10^{-3}}} \right]^{-2} , \quad \left( \frac{3}{2} \right)^{-2} + \left( \frac{6}{5} \right)^{-1} , \quad \frac{(5870)^0}{\frac{(3\sqrt{3})^{-4}}{10^{-3}}} , \quad 3\sqrt{5^{-4}} , \quad \left( \frac{2}{\sqrt{7}} \right)^{-4} , \quad (-3\sqrt{5})^3$$

$$\frac{(-2\sqrt{3})^{-2}}{\left(\frac{18}{7}\right)^{-2}} , \quad 5^{-2} - (-\sqrt{5})^{-2} , \quad \left( \frac{2}{5} \right)^{-1} \times \left( -\frac{5}{2} \right)^{-4} , \quad (-2\sqrt{5})^{-2} \times (-2\sqrt{5})^3$$

### التمرين عدد 4

أحسب العبارات التالية :

$$B = 9 \times \left(-\frac{3}{2}\right)^{-2} - 4 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{-3} \times 27^{-1} ; A = \left[(-\sqrt{5})^{-2}\right]^3 \times \left[\left(\frac{1}{5\sqrt{2}}\right)^{-2} - (3\sqrt{5})^2\right]$$

$$E = \frac{28^2 \times 25^2}{(3^{-4})^2 \times 49} ; D = \frac{-3}{4} \times \frac{125 \times 10^{-3}}{500} - \frac{0.5 \times 10^3}{250} ; C = \left[\frac{-\frac{5}{2}+1}{\frac{5}{4} \times 3}\right]^{-3}$$

$$G = \frac{2^{10} \times 125^2 \times 20}{16 \times (-5)^8} ; F = \frac{2^{-6} \times 35^4}{5^5 \times 7^7} \times \frac{10^3}{14^{-3}}$$

### التمرين عدد 5

لتكن العبارة  $A = \frac{(a^{-1}b^{-2})^{-3}(ab^2)^{-2}}{(ab)^4}$  حيث  $a$  و  $b$  عددين حقيقيين مخالفان لصفر

(1) بين أن  $A = a^{-3}b^{-2}$       (2) أحسب  $A$  إذا علمت أن  $b = 2\sqrt{2}$  و  $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$

### التمرين عدد 6

لتكن العبارة  $A = \frac{8a^3(b^{-2})^3}{2a^2b^{-4}}$  حيث  $a$  و  $b$  عددين حقيقيين مخالفان لصفر

(1) بين أن  $A = 2^2ab^{-2}$

(2) أحسب  $A$  إذا علمت أن  $b = -7\sqrt{2}$  و  $a = \frac{3}{2}$

(3) لتكن العبارة  $B = \frac{1}{4}a^{-1}b^2$       (4) بين أن  $A$  و  $B$  مقولبان

(4) استنتج حساب العبارة  $B$  إذا علمت أن  $b = -7\sqrt{2}$  و  $a = \frac{3}{2}$

### التمرين عدد 7

أكتب العبارات التالية في صورة قوة للعدد 10 دليلاً لها صحيح نسبي

$$x = \frac{\left(\frac{1}{10}\right)^{-5} \times 100^3}{(0,0001)^{-4} \times 100^{-1}}$$

$$y = \frac{\frac{1}{1000} \times (0,001)^{-2}}{(0,0001)^{-3} \times \left(\frac{1}{1000}\right)^{-1}}$$

$$z = \frac{(10^3)^3 \times (0,0001)^{-2}}{(0,01)^{-7} \times 10^5}$$

### التمرين ٨- عدد

أكتب في صيغة قوة عدد حقيقي دليلاً لها عدد صحيح نسبي مخالف لـ 1

$$b = \left(\frac{4}{3}\right)^6 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^7 \quad \text{و} \quad a = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^{-4} \times \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^{-11}$$

$$e = \frac{\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)^5}{32} \quad \text{و} \quad d = \frac{\left(\frac{\sqrt{14}}{2}\right)^5}{\left(\sqrt{28}\right)^5} \quad \text{و} \quad c = \left(\frac{7}{13}\right)^{-4} \times \left(\sqrt{\frac{7}{13}}\right)^8 \times \frac{49}{169} \quad \text{و}$$

$$h = \left[\left(\sqrt{3}\right)^{-4}\right]^6 \times 6^{-12} \quad \text{و} \quad g = 3^{-2} \times \left(\sqrt{3}\right)^{15} \quad \text{و} \quad f = (3\pi)^{15} \times (15\pi)^{-15} \quad \text{و}$$

$$k = \frac{0,16 \times 5^6}{\sqrt{2^{-4}} \times 10^{-6}} \quad \text{و} \quad j = \frac{5 \times 25^{-3} \times 10^2}{5^{-1} \times 2^4} \quad \text{و} \quad i = \left[\left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^5\right]^2 \times \left(\frac{2}{\sqrt{7}}\right) \times \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^{-4} \quad \text{و}$$

### التمرين ١-دد

أجب بصواب أو خطأ مع تعليق الإجابة في كل حالة

$$\left(\frac{5}{\sqrt{3}}\right)^{-2} = \left(\frac{\sqrt{3}}{5}\right)^2 = \frac{3}{25} \quad \text{صواب لأن } \left(\frac{5}{\sqrt{3}}\right)^{-2} = \frac{3}{25} \quad (1)$$

$$-3(\sqrt{5})^3 = -3 \times 5\sqrt{5} = -15\sqrt{5} \quad \text{صواب لأن } -3\sqrt{5^3} = -15\sqrt{5} \quad (2)$$

$$\left(-\frac{\pi}{3}\right)^{-11} = \left(-\frac{3}{\pi}\right)^{11} \quad \text{خطأ لأن } \left(-\frac{\pi}{3}\right)^{-11} = \left(\frac{3}{\pi}\right)^{11} \quad (3)$$

$$7^3 \neq 7 + 7^2 \quad \text{و } \sqrt{7^6} = 7^3 \quad \text{و } \sqrt{7^2} + \sqrt{7^4} = 7 + 7^2 \quad \text{خطأ لأن } \sqrt{7^2} + \sqrt{7^4} = \sqrt{7^6} \quad (4)$$

$$\frac{\sqrt{3^{45}}}{\sqrt{3^5}} = \sqrt{\frac{3^{45}}{3^5}} = \sqrt{3^{45-5}} = \sqrt{3^{40}} \quad \text{خطأ لأن } \frac{\sqrt{3^{45}}}{\sqrt{3^5}} = \sqrt{\frac{3^{45}}{3^5}} = \sqrt{3^9} \quad (5)$$

$$\sqrt{(10^{-4})^2} = (\sqrt{10^{-4}})^2 = 10^{-4} \quad \text{صواب لأن } 10^{-8} = (10^{-4})^2 \quad (6)$$

### التمرين ٢-دد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية علما وأنه واحدة فقط هي صحيحة

$$-1 \quad (ج) \quad 1 \quad (ب) \quad \frac{1}{8} \quad (أ) \quad \text{يساوي} : \quad (-\sqrt{2})^{-3} \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 \quad (1) \quad \text{العدد}$$

$$1 \quad (ج) \quad \frac{1}{49} \quad (ب) \quad \frac{1}{(7\sqrt{7})^2} \quad (أ) \quad \text{يساوي} : \quad 7(\sqrt{7})^{-2} \quad (2) \quad \text{العدد}$$

$$\left(-\frac{7}{6}\right)^{15} \quad (ج) \quad \left(\frac{7}{6}\right)^{15} \quad (ب) \quad \left(\frac{6}{7}\right)^{15} \quad (أ) \quad \text{يساوي} \quad \left(-\frac{6}{7}\right)^{-15} \quad (3)$$

$$3,487 \times 10^3 \quad (ج) \quad 3,487 \times 10^{-3} \quad (ب) \quad 3,487 \times 10^{-6} \quad (أ) \quad \text{العدد 0,003478 يساوي} \quad (4)$$

$$\left[\left(\sqrt{2}\right)^{-2}\right]^4 \times 125 - \left[\left(\sqrt{2}\right)^{-2}\right]^4 \times 100 \quad (5)$$

$$\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^4 \quad (ج) \quad 16 \times 25 \quad (ب) \quad 25 \quad (أ) \quad \text{يساوي} \quad (6)$$

$$0 \quad (ج) \quad 1 \quad (ب) \quad \frac{10}{3} \quad (أ) \quad \text{يساوي} \quad (\sqrt{3})^{-2} + (-\sqrt{3})^2 \quad (6)$$

### التمرين ٣-دد

أحسب

$$(-3\sqrt{5})^3 = -27 \times 5\sqrt{5} = -135\sqrt{5} \quad >$$

$$\left(\frac{2}{\sqrt{7}}\right)^{-4} = \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^4 = \frac{49}{16} \quad >$$

$$3\sqrt{5^{-4}} = 3(\sqrt{5})^{-4} = 3 \times \frac{1}{(\sqrt{5})^4} = \frac{3}{(\sqrt{5})^4} = \frac{3}{25} \quad >$$

$$\frac{(5870)^0}{\frac{(3\sqrt{3})^{-4}}{10^{-3}}} = \frac{1}{\frac{10^3}{(3\sqrt{3})^4}} = \frac{(3\sqrt{3})^4}{10^3} = (3\sqrt{3})^4 \times 10^{-3} = 729 \times 10^{-3} = 0,729 \rightarrow$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{6}{5}\right)^{-1} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^1 = \frac{4}{9} + \frac{5}{6} = \frac{8+15}{18} = \frac{23}{18} \rightarrow$$

$$\left[\frac{\frac{-5\sqrt{2}}{3}}{\frac{7\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}}\right]^{-2} = \left[\frac{\frac{7\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}}{\frac{-5\sqrt{2}}{3}}\right]^2 = \left[\frac{7\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} \times \frac{1}{\frac{-5\sqrt{2}}{3}}\right]^2 = \left[\frac{7\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} \times \frac{3}{-5\sqrt{2}}\right]^2 \rightarrow$$

$$= \left[-\frac{\cancel{7}\cancel{\sqrt{2}}\cancel{\times}\cancel{3}}{\cancel{3}\sqrt{3}\times\cancel{5}\cancel{\sqrt{2}}}\right]^2 = \left[-\frac{7}{5\sqrt{3}}\right]^2 = \frac{49}{75}$$

$$(-2\sqrt{5})^{-2} \times (-2\sqrt{5})^3 = (-2\sqrt{5})^{-2+3} = (-2\sqrt{5})^1 = -2\sqrt{5} \rightarrow$$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{-1} \times \left(-\frac{5}{2}\right)^{-4} = \left(\frac{2}{5}\right)^{-1} \times \left(-\frac{2}{5}\right)^4 = \left(\frac{2}{5}\right)^{-1} \times \left(\frac{2}{5}\right)^4 \rightarrow$$

$$= \left(\frac{2}{5}\right)^{-1+4} = \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{8}{125}$$

$$5^{-2} - (-\sqrt{5})^{-2} = \frac{1}{5^2} - \frac{1}{(-\sqrt{5})^2} = \frac{1}{25} - \frac{1}{5} = \frac{1}{25} - \frac{5}{25} = -\frac{4}{25} \rightarrow$$

$$\frac{(-2\sqrt{3})^{-2}}{\left(\frac{18}{7}\right)^{-2}} = \left[\frac{-2\sqrt{3}}{\frac{18}{7}}\right]^{-2} = \left[-2\sqrt{3} \times \frac{7}{18}\right]^{-2} = \left[\frac{-7\sqrt{3}}{9}\right]^{-2} \rightarrow$$

$$= \left[-\frac{9}{7\sqrt{3}}\right]^2 = \frac{81}{49 \times 3} = \frac{27 \times 3}{49 \times 3} = \frac{27}{49}$$

#### التمرين عدد ٤

أحسب العبارات التالية :

$$A = \left[(-\sqrt{5})^{-2}\right]^3 \times \left[\left(\frac{1}{5\sqrt{2}}\right)^{-2} - (3\sqrt{5})^2\right] \rightarrow$$

$$= \left[\frac{1}{(-\sqrt{5})^2}\right]^3 \times \left[(5\sqrt{2})^2 - (3\sqrt{5})^2\right] = \left(\frac{1}{5}\right)^3 \times [50 - 45] = \frac{1}{125} \times 5 = \frac{1}{25}$$

$$B = 9 \times \left(-\frac{3}{2}\right)^{-2} - 4 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{-3} \times 27^{-1} = 9 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^2 - 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^3 \times \frac{1}{27} \rightarrow$$

$$= 9 \times \frac{4}{9} - 4 \times \frac{27}{8} \times \frac{1}{27} = \frac{9 \times 4}{9} - \frac{4 \times 27 \times 1}{8 \times 27} = 4 - \frac{1}{2} = \frac{8}{2} - \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$

$$C = \left[\frac{\frac{5}{2}+1}{\frac{5}{4} \times 3}\right]^{-3} = \left[\frac{\frac{5+2}{2}}{\frac{15}{4}}\right]^{-3} = \left[\frac{\frac{3}{2}}{\frac{15}{4}}\right]^{-3} = \left[-\frac{3}{2} \times \frac{4}{15}\right]^{-3} \rightarrow$$

$$= \left[ -\frac{3 \times 4}{2 \times 3 \times 5} \right]^{-3} = \left[ -\frac{2}{5} \right]^{-3} = \left[ -\frac{5}{2} \right]^3 = -\frac{125}{8}$$

$$D = \frac{-3}{4} \times \frac{125 \times 10^{-3}}{500} + \frac{0,5 \times 10^3}{250} = -\frac{1,5 \times 125 \times 10^{-3}}{2 \times 500} - \frac{4 \times 0,5 \times 10^3}{4 \times 250} \rightarrow$$

$$= \frac{-15 \times 10^{-1} \times 125 \times 10^{-3}}{1000} - \frac{2 \times 10^3}{1000}$$

$$= -1875 \times 10^{-1} \times 10^{-3} \times 10^{-3} - 2 \times 10^3 \times 10^{-3}$$

$$= -1875 \times 10^{-7} - 2$$

$$= -(0,0001875 + 2) = -2,0001875$$

$$E = \frac{2^{82} \times 25^2}{(3^{-4})^2 \times 49} = \frac{(4 \times 7)^2 \times 25^2}{3^{-8} \times 7^2} = 4^2 \times 7^2 \times 25^2 \times 3^8 \times 7^{-2} \rightarrow$$

$$= (4 \times 25)^2 \times 7^{2+(-2)} \times 3^8 = 100^2 \times 1 \times 3^8 = 6561 \times 10^4 = 65610000$$

$$F = \frac{2^{-6} \times 35^4}{5^5 \times 7^7} \times \frac{10^3}{14^{-3}} = 2^{-6} \times (5 \times 7)^4 \times 5^{-5} \times 7^{-7} \times 10^3 \times (2 \times 7)^3 \rightarrow$$

$$= 2^{-6} \times 5^4 \times 7^4 \times 5^{-5} \times 7^{-7} \times 10^3 \times 2^3 \times 7^3$$

$$= 2^{-6+3} \times 5^{4+(-5)} \times 7^{4+(-7)+3} \times 10^3 = 2^{-3} \times 5^{-1} \times 7^0 \times 10^3$$

$$= \frac{10^3}{2^3 \times 5} = \frac{10^3 \times 5^2}{2^3 \times 5 \times 5^2} = \frac{10^3 \times 25}{10^3} = 25$$

$$G = \frac{2^{10} \times 125^2 \times 20}{16 \times (-5)^8} = \frac{2^{10} \times (5^3)^2 \times 4 \times 5}{2^4 \times 5^8} = 2^{10} \times 5^6 \times 2^2 \times 5^1 \times 2^{-4} \times 5^{-8} \rightarrow$$

$$= 2^{10+2+(-4)} \times 5^{6+1+(-8)} = 2^8 \times 5^{-1} = \frac{2^8}{5} = \frac{256}{5}$$

### التمرين ٥

لتكن العبارة  $A = \frac{(a^{-1}b^{-2})^{-3}(ab^2)^{-2}}{(ab)^4}$  حيث  $a$  و  $b$  عددين حقيقيان مخالفان لصف

$$A = a^{-3}b^{-2} \quad \text{أين أن } \quad (1)$$

$$A = \frac{(a^{-1}b^{-2})^{-3}(ab^2)^{-2}}{(ab)^4} = (a^{-1})^{-3}(b^{-2})^{-3}a^{-2}(b^2)^{-2}a^{-4}b^{-4}$$

$$= a^3b^6a^{-2}b^{-4}a^{-4}b^{-4} = a^{3+(-2)+(-4)}b^{6+(-4)+(-4)} = a^{-3}b^{-2}$$

$$A = a^{-3}b^{-2} \quad \text{إذن}$$

$b = 2\sqrt{2}$  و  $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$  (2) أحسب  $A$  إذا علمت أن

$b = 2\sqrt{2}$  و  $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$  لدينا  $A = a^{-3}b^{-2}$

$$A = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{-3} (2\sqrt{2})^{-2} = (\sqrt{2})^3 \times 2^{-2} \times (\sqrt{2})^{-2} = (\sqrt{2})^{3+(-2)} \times \frac{1}{2^2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

### التمرين ع-6

لتكن العبارة  $A = \frac{8a^3(b^{-2})^3}{2a^2b^{-4}}$  حيث  $a$  و  $b$  عدادان حقيقيان مخالفان لصفر

(1) بين أن  $A = 2^2ab^{-2}$

$$A = \frac{8a^3(b^{-2})^3}{2a^2b^{-4}} = \frac{8}{2} \times \frac{a^3}{a^2} \times \frac{b^{-6}}{b^{-4}} = 4a^{3-2}b^{-6-(-4)} = 4a^1b^{-2} = 2^2ab^{-2}$$

إذن  $A = 2^2ab^{-2}$

(2) أحسب  $A$  إذا علمت أن  $b = -7\sqrt{2}$  و  $a = \frac{3}{2}$

$$A = 2^2ab^{-2} = 4 \times \frac{3}{2} \times (-7\sqrt{2})^{-2} = 4 \times \frac{3}{2} \times \frac{1}{49 \times 2} = \frac{4 \times 3}{2 \times 49 \times 2} = \frac{3}{49}$$

إذن  $A = \frac{3}{49}$

(3) لتكن العبارة  $B = \frac{1}{4}a^{-1}b^2$  بين أن  $A$  و  $B$  مقلوبان

لذلك نحسب  $AB$

$$AB = (2^2ab^{-2}) \left(\frac{1}{4}a^{-1}b^2\right) = \left(4 \times \frac{1}{4}\right)(aa^{-1})(b^{-2}b^2) = 1 \times 1 \times 1 = 1$$

إذن  $AB = 1$  و بالتالي  $A$  و  $B$  مقلوبان

(4) استنتج حساب العبارة  $B$  إذا علمت أن  $b = -7\sqrt{2}$  و  $a = \frac{3}{2}$

بما أن  $A$  و  $B$  مقلوبان مهما يكن  $a$  و  $b$  فإن  $B = \frac{1}{A}$

$$B = \frac{1}{A} \text{ إذا كان } A = \frac{3}{49} \text{ ولدينا } b = -7\sqrt{2} \text{ و } a = \frac{3}{2} \text{ إذن }$$

إذن  $B = \frac{49}{3}$

### التمرين ع-7

أكتب العبارات التالية في صورة قوة للعدد 10 دليلاً صحيحاً نسبياً

$$x = \frac{\left(\frac{1}{10}\right)^{-5} \times 100^3}{(0,0001)^{-4} \times 100^{-1}} = \frac{10^5 \times (10^2)^3}{(10^{-4})^{-4} \times (10^2)^{-1}} = \frac{10^5 \times 10^6}{10^{16} \times 10^{-2}} >$$

$$= 10^5 \times 10^6 \times 10^{-16} \times 10^2 = 10^{5+6+(-16)+2} = 10^{-3}$$

$$y = \frac{\frac{1}{1000} \times (0,001)^{-2}}{(0,0001)^{-3} \times \left(\frac{1}{1000}\right)^{-1}} = \frac{10^{-3} \times (10^{-3})^{-2}}{(10^{-4})^{-3} \times (10^{-3})^{-1}} = \frac{10^{-3} \times 10^6}{10^{12} \times 10^3}$$

$$= 10^{-3} \times 10^6 \times 10^{-12} \times 10^{-3} = 10^{-3+6+(-12)+(-3)} = 10^{-12}$$

$$z = \frac{(10^3)^3 \times (0,0001)^{-2}}{(0,01)^{-7} \times 10^5} = \frac{10^6 \times (10^{-4})^{-2}}{(10^{-2})^{-7} \times 10^5} = \frac{10^6 \times 10^8}{10^{14} \times 10^5}$$

$$= 10^6 \times 10^8 \times 10^{-14} \times 10^{-5} = 10^{6+8+(-14)+(-5)} = 10^{-5}$$

### التمرين عـ ٨

أكتب في صيغة قوة عدد حقيقي دليلاً لها عدد صحيح نسبي مخالف لـ 1

$$a = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^{-4} \times \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^{-11} = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^{-4} \times \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^{11} = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^{-4+11} = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^7$$

$$b = \left(\frac{4}{3}\right)^6 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^7 = \left[\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2\right]^6 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^7 = \left[\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2\right]^6 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^7$$

$$= \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{12} \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^7 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{-12} \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^7$$

$$= \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{-12+7} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{-5}$$

$$c = \left(\frac{7}{13}\right)^{-4} \times \left(\sqrt{\frac{7}{13}}\right)^8 \times \frac{49}{169} = \left(\frac{7}{13}\right)^{-4} \times \left[\left(\sqrt{\frac{7}{13}}\right)^2\right]^4$$

$$= \left(\frac{7}{13}\right)^{-4} \times \left(\frac{7}{13}\right)^4 \times \left(\frac{7}{13}\right)^2 = \left(\frac{7}{13}\right)^{4+(-4)+2} = \left(\frac{7}{13}\right)^2$$

$$d = \frac{(\sqrt{14})^5}{(\sqrt{28})^5} = \left[\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{28}}\right]^5 = \left[\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{2} \times \sqrt{14}}\right]^5 = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}\right]^5 = \frac{1^5}{(\sqrt{2})^5} = \frac{1}{(\sqrt{2})^5} = (\sqrt{2})^{-5}$$

$$e = \frac{\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)^5}{32} = \frac{\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)^5}{2^5} = \left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)^5 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2}\right)^5 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^5$$

$$f = (3\pi)^{15} \times (15\pi)^{-15} = (3\pi)^{15} \times \frac{1}{(15\pi)^{15}} = \frac{(3\pi)^{15}}{(15\pi)^{15}} = \left[\frac{3\pi}{15\pi}\right]^{15} = \left[\frac{1}{5}\right]^{15}$$

$$g = 3^{-2} \times (\sqrt{3})^{15} = \left[(\sqrt{3})^2\right]^{-2} \times (\sqrt{3})^{15} = (\sqrt{3})^{-4} \times (\sqrt{3})^{15}$$

$$= (\sqrt{3})^{-4+15} = (\sqrt{3})^{11}$$

$$h = \left[ (\sqrt{3})^{-4} \right]^6 \times 6^{-12} = \left[ ((\sqrt{3})^2)^{-2} \right]^6 \times 6^{-12} = 3^{-12} \times 6^{-12} \quad \text{➤}$$

$$= (3 \times 6)^{-12} = 18^{-12}$$

$$i = \left[ \left( \frac{\sqrt{7}}{2} \right)^5 \right]^2 \times \left( \frac{2}{\sqrt{7}} \right) \times \left( \frac{\sqrt{7}}{2} \right)^{-4} = \left( \frac{\sqrt{7}}{2} \right)^{10} \times \left( \frac{\sqrt{7}}{2} \right)^{-1} \times \left( \frac{\sqrt{7}}{2} \right)^{-4} \quad \text{➤}$$

$$= \left( \frac{\sqrt{7}}{2} \right)^{10+(-1)+(-4)} = \left( \frac{\sqrt{7}}{2} \right)^5$$

$$j = \frac{5 \times 25^{-3} \times 10^2}{5^{-1} \times 2^4} = 5 \times (5^2)^{-3} \times (5 \times 2)^2 \times 5^1 \times 2^{-4} \quad \text{➤}$$

$$= 5 \times 5^{-6} \times 5^2 \times 5^1 \times 2^2 \times 2^{-4} = 5^{-2} \times 2^{-2} = (5 \times 2)^{-2} = 10^{-2}$$

$$k = \frac{0,16 \times 5^6}{\sqrt{2^{-4}} \times 10^{-6}} = \frac{16 \times 10^{-2} \times 5^6}{(\sqrt{2})^{-4} \times 10^{-6}} = 2^4 \times 10^{-2} \times 5^6 \times (\sqrt{2})^4 \times 10^6 \quad \text{➤}$$

$$= 2^4 \times ((\sqrt{2})^2)^2 \times 5^6 \times 10^6 = 2^4 \times 2^2 \times 5^6 \times 10^6 = 2^6 \times 5^6 \times 10^6$$

$$= (2 \times 5)^6 \times 10^6 = 10^6 \times 10^6 = 10^{6+6} = 10^{12}$$